

Thema Nr. 2
(Aufabengruppe)

Es sind alle Aufgaben dieser Aufabengruppe zu bearbeiten!

Aufgabe 1:

Seien $n, m > 0$ natürliche Zahlen. Mit $M_{n,m}(\mathbb{Q})$ bezeichnen wir die Menge der $(n \times m)$ -Matrizen mit rationalen Einträgen. Seien $GL_n(\mathbb{Q})$ und $GL_m(\mathbb{Q})$ die allgemeinen linearen Gruppen in den Dimensionen n und m über \mathbb{Q} .

a) Zeigen Sie, dass die Gruppe $GL_n(\mathbb{Q}) \times GL_m(\mathbb{Q})$ vermöge

$$(GL_n(\mathbb{Q}) \times GL_m(\mathbb{Q})) \times M_{n,m}(\mathbb{Q}) \rightarrow M_{n,m}(\mathbb{Q}), \quad ((S, T), A) \mapsto S \cdot A \cdot T^{-1}$$

auf $M_{n,m}(\mathbb{Q})$ operiert, aber nicht effektiv. (Dabei heißt eine Gruppenoperation $G \times X \rightarrow X$ einer Gruppe G auf einer Menge X *effektiv*, wenn aus $\forall x \in X: g \cdot x = x$ für ein Gruppenelement $g \in G$ schon $g = 1$ folgt.)

b) Zeigen Sie, dass diese Operation genau $r + 1$ Bahnen besitzt, dabei ist $r := \min(m, n)$.
(Tipp: Verwenden Sie den Rang einer Matrix.) (6 Punkte)

Aufgabe 2:

Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine natürliche Zahl. Zeigen Sie, dass das Polynom $f(X) = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$ keine mehrfachen Nullstellen in den komplexen Zahlen besitzt. (6 Punkte)

Aufgabe 3:

Seien p eine Primzahl und ζ eine primitive p -te Einheitswurzel in \mathbb{C} . Sei $R = \mathbb{Z}[\zeta]$ der von ζ erzeugte Unterring von \mathbb{C} . Sei $a \in \mathbb{Z}$ eine ganze Zahl. Zeigen Sie, dass

$$\mathbb{Z} / \left(\sum_{\ell=0}^{p-1} a^\ell \right) \rightarrow R / (a - \zeta), \quad n + \left(\sum_{\ell=0}^{p-1} a^\ell \right) \mapsto n + (a - \zeta)$$

ein wohldefinierter Ringisomorphismus ist und folgern Sie daraus, dass $2 - \zeta$ genau dann ein Primelement in R ist, wenn $2^p - 1$ eine Primzahl ist.

(6 Punkte)